

PROCESSO SELETIVO 2016/1 – VAGAS REMANESCENTES PARA
MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

RESIDÊNCIA MÉDICA

Caderno de Provas

PROVA	QUESTÕES
CLÍNICA MÉDICA	01 - 10
CIRURGIA GERAL	11 - 20
PEDIATRIA	21 - 30
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	31 - 40
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	41 - 50

INSTRUÇÕES GERAIS

- A prova terá duração de quatro horas. Você somente poderá sair duas horas após o início da prova.
 - Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos. Não é permitido consultar apontamentos, livros ou dicionários.
 - Solicite a presença do fiscal apenas em caso de extrema necessidade.
 - Este caderno contém a prova objetiva, com 50 questões de múltipla escolha.
 - Cada questão apresenta 04 alternativas para resposta, das quais apenas uma é a correta.
 - Ao utilizar o Cartão-Resposta, confira o número de sua inscrição e o seu nome.
- Depois, assine no retângulo adequado (não faça outras anotações ou marcas).
- Leia atentamente as instruções para preenchimento do Cartão-Resposta. Em nenhuma hipótese será distribuída duplicata do Cartão-Resposta.
 - Para marcar as respostas no Cartão-Resposta, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 - Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta.
 - Ao terminar as provas, devolva para o fiscal:
 - o caderno de Provas.
 - o Cartão-Resposta;

CLÍNICA MÉDICA

Questão 1

Idoso, 82 anos, é levado por familiares para consulta. Ele tem se queixado de astenia. Não há histórico de abuso de álcool ou doença hepática prévia, porém, ao exame físico ele se apresenta com icterícia leve. O abdome é flácido, indolor, sem a presença de circulação colateral ou ascite, sem visceromegalias ou massas palpáveis. Um hemograma recente mostra anemia normocítica e normocromica. Qual o próximo passo na avaliação do paciente?

- A) () USG do Abdome Superior.
- B) () Provas de função hepática.
- C) () HbsAg e Anti-HCV.
- D) () Tomografia do abdome.

Questão 2

É causa de alargamento do complexo QRS no ECG:

- A) () Hipocalemia.
- B) () Hipercalemia.
- C) () Hipercalemia.
- D) () Hipocalcemia.

Questão 3

Mulher, 52 anos, se envolve em um acidente automobilístico e é trazida pelo SAMU até o pronto-socorro. O socorrista conta que ela abre os olhos ao estímulo verbal, está confusa e localiza o estímulo doloroso. Qual o Glasgow calculado da paciente?

- A) () 12.
- B) () 15.
- C) () 13.
- D) () 14.

Questão 4

Moça de 21 anos apresenta-se com queixas de vários episódios de dor em região temporal esquerda, latejante, com duração de 2 a 3 horas. Antes de seu início, ela vê flashes de luz em seu campo visual direito e sente fraqueza e dormência no lado direito de seu corpo por alguns minutos. Muitas vezes a dor é acompanhada de náuseas e vômitos. A avó já falecida apresentava quadro clínico semelhante. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) () Arterite temporal.
- B) () Migrânea Complicada.
- C) () Mastoidite crônica.
- D) () AVE isquêmico.

Questão 5

Aluna de medicina de 21 anos apresenta quadro de náuseas e vômitos incoercíveis duas horas após comer salada de maionese em um churrasco da turma. Ela não apresenta diarreia, febre ou calafrios. Ao exame ela apresenta-se desidratada mas o restante do exame físico é normal. Qual o agente etiológico mais provável?

- A) () *Entamoeba histolytica*.
- B) () *Giardia lamblia*.
- C) () *Shigella dysenteriae*.
- D) () *Staphylococcus aureus*.

Questão 6

Homem, 32 anos, previamente saudável, assintomático, vem a consulta com um resultado de EAS mostrando hematúria. Na revisão de sistemas ele negou a ocorrência de febre, anorexia, perda de peso, dor lombar, dor abdominal, disúria, polaciúria. O pai é renal crônico e está em diálise. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) () Câncer de bexiga.
- B) () Ureterolitíase.
- C) () Doença renal policística.
- D) () Infecção urinária.

Questão 7

É causa de prolongamento do intervalo QT no ECG:

- A) () Hipocalemia.
- B) () Hipercalemia.
- C) () Hipercalemia.
- D) () Hipocalcemia.

Questão 8

Jovem do sexo masculino de 20 anos com queixas de cefaleia hemicraniana direita severa, intensidade 10 em uma escala de 1 a 10. Durante a “crise” há lacrimejamento, congestão conjuntival e coriza aquosa ipsilateral à dor. Os episódios são sempre noturnos com episódios durando algo por volta de 40 minutos. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- A) () Arterite temporal.
- B) () Migrânea complicada.
- C) () Cefaleia em salvas.
- D) () Rinossinusite aguda.

Questão 9

Uma mulher de 30 anos de idade com prolapso da válvula mitral e sopro de regurgitação mitral desenvolve febre, perda de peso e anorexia depois de passar por um procedimento odontológico. Qual o agente etiológico mais provável?

- A) () *Streptococcus pneumoniae*.
- B) () *Staphylococcus aureus*.
- C) () *Providencia stuartii*.
- D) () *Streptococcus viridans*.

Questão 10

Homem, 42 anos, etilista e tabagista, comparece no pronto socorro com quadro de dor abdominal muito intensa compatível com pancreatite aguda. Sobre o quadro clínico da pancreatite aguda marque a alternativa **incorreta**:

- A) () Febre e taquicardia são alterações de sinais vitais muito comuns.
- B) () Icterícia pode estar presente, mas é pouco comum.
- C) () A presença de defesa involuntária e ruídos hidroaéreos diminuídos praticamente excluem o diagnóstico de pancreatite.
- D) () O sinal de Cullen está relacionado a presença de hemoperitoneo e é incomum.

CIRURGIA GERAL

Questão 11

Dentre os materiais utilizados para sutura, dispomos de materiais naturais ou sintéticos, absorvíveis e inabsorvíveis, mono ou multifilamentar. Marque a alternativa onde temos apenas material sintético e monofilamentar:

- A) () Polietileno (Nylon) e Algodão.
- B) () Polietileno (Nylon) e Polipropileno (Prolene).
- C) () Poliglactina (Vicryl) e Polipropileno (Prolene).
- D) () Algodão e Linho.

Questão 12

Onde se origina a base do apêndice cecal?

- A) () A base do apêndice cecal se localiza na confluência das tênias no ceco.
- B) () A base do apêndice cecal se localiza no ceco, na tênia anterior.
- C) () O apêndice cecal pode ter a sua base se originando em qualquer parte do ceco.
- D) () A base do apêndice cecal se localiza no ceco, junto à válvula ileocecal.

Questão 13

A parede abdominal é sítio de vários tipos de hérnias, sendo a hérnia inguinal bastante frequente. Estas apresentam uma classificação chamada Nyhus, que visa estabelecer o tipo e o comprometimento das estruturas da parede. Segundo esta classificação, a hérnia Tipo III-A de Nyhus, refere-se a uma hérnia:

- A) () Hérnia inguinal direta com defeito da parede posterior.
- B) () Hérnia inguinal indireta, com anel inguinal interno normal.
- C) () Hérnia inguinal indireta com anel interno dilatado, mas a parede posterior está íntegra.
- D) () Hérnia recorrente direta.

Questão 14

Nos casos de pneumotórax hipertensivo, o tratamento de emergência se impõe, sendo que o mesmo precede a drenagem torácica que é o tratamento definitivo na maioria dos casos. Esse tratamento emergencial consiste no seguinte passo:

- A) () Deve-se realizar RX de tórax em AP, de emergência para o correto diagnóstico e para definir qual o hemitórax a ser punccionado.
- B) () Punção com Gelco 18, no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular do hemitórax afetado pelo pneumotórax hipertensivo.
- C) () Punção com Gelco 18, na face posterior do hemitórax afetado pelo pneumotórax hipertensivo, junto ao ângulo da escápula.
- D) () Punção com Gelco 18, no quinto espaço intercostal, linha axilar média, do hemitórax afetado pelo pneumotórax hipertensivo.

Questão 15

Nos pacientes lactentes e crianças, a patologia cirúrgica mais frequente é a hérnia inguinal. Nesta faixa etária, qual a técnica cirúrgica mais preconizada para o tratamento destas hérnias?

- A) () Bassini.
- B) () Ligadura alta do saco herniário indireto.
- C) () Mac Vay.
- D) () Shouldice.

Questão 16

Qual a complicação cirúrgica pulmonar mais comum?

- A) () Pneumonia Bacteriana.
- B) () Broncoespasmo.
- C) () Atelectasia.
- D) () Pneumonia Viral.

Questão 17

A circulação hepática apresenta sua irrigação fornecida por dois sistemas, um arterial e um venoso. Qual alternativa relaciona corretamente os vasos que fazem essa irrigação e qual o percentual aproximado de fluxo que cada um contribui para a irrigação hepática?

- A) () Artéria Hepática (25%) e Veia Porta (75%).
- B) () Artéria Hepática (50%) e Veia Porta (50%).
- C) () Artéria Hepática (25%) e Veia Cava Inferior (75%).
- D) () Artéria Hepática (75%) e Veia Cava Inferior (25%).

Questão 18

Os quadros de hemorragia digestiva podem acometer qualquer porção do tubo digestivo, sendo dividida em hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Qual o limite anatômico delimita e define se o quadro trata-se de uma hemorragia digestiva alta ou baixa?

- A) () Válvula ileocecal.
- B) () Píloro.
- C) () Esfíncter Esofágico Inferior.
- D) () Ângulo de Treitz.

Questão 19

O sistema urinário é sítio frequente de litíase, sendo esta sintomática, principalmente quando ocorre ureterolitíase. Na passagem do cálculo pelo ureter, este apresenta 3 áreas de estreitamento fisiológico, onde o cálculo pode ter dificuldade na passagem, esses estreitamentos são?

- A) () Junção ureteropélvica (JUP), cruzamento do ureter com os vasos ilíacos e junção ureterovesical (JUV).
- B) () Junção ureteropélvica (JUP), passagem do ureter sobre o músculo psoas e junção ureterovesical (JUV).
- C) () Cálice renal inferior, cruzamento do ureter com os vasos ilíacos e junção ureterovesical (JUV).

- D) () Junção ureteropélvica (JUP), cruzamento do ureter com os vasos ilíacos e passagem do ureter junto ao osso sacro.

Questão 20

Após a realização de um acesso venoso central, devemos sempre solicitar uma radiografia de tórax de controle. Marque a alternativa que contemplem as indicações para a realização deste exame.

- A) () Identificar hemotórax ou alargamento de mediastino, identificar pneumotórax, identificar alterações anatômicas vasculares que dificultaram a passagem do cateter.
- B) () Visualizar o posicionamento do cateter, identificar hemotórax ou alargamento do mediastino, identificar pneumotórax.
- C) () Visualizar o posicionamento do cateter, identificar hemotórax ou alargamento do mediastino, causados por lesão do parênquima pulmonar.
- D) () A realização deste exame é dispensada se o médico que realizar o procedimento for experiente e o procedimento ocorrer sem intercorrências.

PEDIATRIA

Questão 21

Assinale a alternativa **correta**: Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, o tempo recomendado de Aleitamento Materno exclusivo e Aleitamento Total é respectivamente:

- A) () 4 a 6 meses – pelo menos 1 ano.
- B) () 4 a 6 meses – pelo menos 2 anos.
- C) () 4 meses – pelo menos 1 ano.
- D) () 6 meses – pelo menos 2 anos.

Questão 22

A antibioticoterapia de escolha na Síndrome de Aspiraço Meconial é feita com:

- A) () Oxacilina e Aminoglicosídeo.
- B) () Cefuroxima e Sulbactam.
- C) () Ampicilina e Aminoglicosídeo.
- D) () Oxacilina e Metronidazol.

Questão 23

Maria é uma lactente de 4 meses de vida e está no posto de saúde para consulta de puericultura. Peso do nascimento 3350g, estatura de 50cm e perímetro 35cm. Hoje seu peso é de 6700g, estatura de 62cm e perímetro cefálico de 40,5cm. Marque a alternativa **incorreta**.

- A) () Maria vai receber as vacinas do 4º mês: Salk, pneumocócica e a tríplice bacteriana e meningocócica.
- B) () O peso de Maria está correto para a idade.
- C) () O peso do lactente dobra com 4 meses.
- D) () No primeiro trimestre de vida, o ganho de peso por dia é de 25 a 30g.

Questão 24

Traumatismos fetais são lesões infligidas ao feto durante o parto espontâneo, dependentes de fatores externos (mecânicos) ou internos (anoxia), e que levam a distúrbios funcionais, temporários ou definitivos no recém-nascido e de prevenção difícil devido seu aspecto multifatorial.

Marque a alternativa **incorreta** em relação às lesões ocorridas durante o parto.

- A) () Hematoma do esternocleidomastóideo (torcicolo congênito) resulta da tração exagerada por hiper-rotação do pescoço, mais comum nos partos pélvicos.
- B) () Bossa serossanguínea é o aumento difuso da espessura do subcutâneo relacionado à êxtase circulatória regional por compressões contínuas sobre o feto no canal de parto e útero.
- C) () Cefalatomia é o derrame sanguíneo subperiosteal, sem limites, portanto, não respeita as suturas.
- D) () Fratura de clavícula é a mais frequente (90%) das fraturas em recém-nascidos, geralmente unilateral e é provocada por pressão manual direta ou por tração excessiva nos desprendimentos de ombros ou cabeça derradeira ou manobras de Kristeller.

Questão 25

Um RN a termo apresenta ao nascimento, mácula escura e azulada com localização em região lombossacra. O diagnóstico mais provável é:

- A) () Nevohipocromico.
- B) () Mancha mongólica.
- C) () Mielomeningocele.
- D) () Hemangioma plano.

Questão 26

As IVAS são uma das principais causas de consultas ambulatoriais. Marque a alternativa **correta**.

Paulo tem 15 meses de idade, com rinofaringite aguda, apresentando bom estado geral, febrícula (temperatura de 37,5), com tosse a 2 dias, dor de garganta e coriza hialina. Neste caso deve-se indicar o seguinte tratamento para Paulo:

- A) () Aumento da ingestão hídrica, analgésicos e uso solução fisiológica nasal.
- B) () Mucolíticos, uso solução fisiológica nasal e descongestionante tópicos.
- C) () Antinflamatórios, aumento da ingestão hídrica, analgésicos e mucolíticos.
- D) () Analgésicos, mucolíticos, manutenção da dieta habitual e descongestionantes tópicos.

Questão 27

Marque a alternativa **correta**: A proteína do soro com maior concentração no leite materno é:

- A) () Beta-lactoalbumina.
- B) () Lactoferrina.
- C) () IgA secretora.
- D) () Alfa_lactoalbumina.

Questão 28

Peculiaridades do exame do RN (recém-nascido). Exame físico. Marque a alternativa **incorreta**.

- A) () A fontanela anterior ou bregmática começa a fechar entre o 9º e o 18º mês.
- B) () A chamada icterícia fisiológica aparece nas 24 horas de vida.
- C) () Miliun sebáceo consiste de pequenos pontos brancos que aparecem nas asas do nariz e regiões genianas, devido à obstrução e a distensão das glândulas sebáceas por secreções.
- D) () Vénix caseosa - camada de gordura branca, que a sua ausência ou presença em pequena quantidade pode indicar que o feto passou da hora (pós-maturidade) de nascer ou é prematuro.

Questão 29

Aos 3 meses de idade a maioria das crianças normais de termo devem ser capazes de realizar as seguintes tarefas.

Marque a alternativa **incorreta**.

- A) Sorrir quando encorajada.
- B) Proferir ruídos guturais.
- C) Elevar a cabeça da mesa de exames.
- D) Manter-se na posição sentada.

Questão 30

Desenvolvimento significa aumento da capacidade de o indivíduo de realizar funções cada vez mais complexas. Marque a alternativa **incorreta**.

O desenvolvimento tem as seguintes características:

- A) Processo contínuo.
- B) Direção cefalocaudal.
- C) Sequência fixa e variável.
- D) Ritmo diferentes (lento e rápido).

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Questão 31

Dos sinais ligados ao desenvolvimento uterino inicial, quando o útero em torno de 6 a 8 semanas assume consistência elástica e amolecida, sobre todo na região ístmica possibilitando a flexão do corpo sobre o colo no toque bimanual denomina-se:

- A) Sinal de HOZAPFEL.
- B) Sinal de NOBILE-BUDIN.
- C) Sinal de HEGAR.
- D) Sinal de GOODEL.

Questão 32

Grávida de 22 anos com 18 semanas de gestação que traz exames de toxoplasmose IgG + e IgM+, a conduta será:

- A) Orientação e sorologia trimestral.
- B) Confirmar com teste de avides.
- C) Tranquilizar e prosseguir o pré-natal.
- D) Encaminhar para internação.

Questão 33

Define-se abortamento em fetos com:

- A) Menos de 27 semanas.
- B) Menos de 30 semanas.
- C) Entre 22 e 25 semanas.
- D) Entre 20 e 22 semanas.

Questão 34

No tratamento da condilomatose genital na gestação se utiliza:

- A) Podofilina.
- B) Ácido tricloroacético.
- C) Ácido Salicílico.
- D) Criogenese.

Questão 35

Os batimentos cardíofetais podem ser identificados pelo sonar em consulta ambulatorial a partir de:

- A) 7 a 8 semanas.
- B) 9 a 10 semanas.
- C) 9 semanas.
- D) 12 semanas.

Questão 36

A hemoglobina considerada normal para a gestação é de:

- A) 9 g/dl.
- B) 11g/dl.
- C) 13 g/dl.
- D) 9,5 g/dl.

Questão 37

A avaliação ultrassonográfica da idade gestacional é mais precisa a partir da:

- A) da 4ª a 10ª semanas.
- B) da 5ª a 6ª semanas.
- C) da 6ª a 8ª semanas.
- D) da 6ª a 12ª semanas.

Questão 38

O Ministério da Saúde determina que as seguintes ações façam parte do pré-natal, **exceto**:

- A) Prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de colo e mama.
- B) Imunização antitetânica.
- C) Anamnese e exame clínico obstétrico da gestante.
- D) Exame Psicológico da gestante.

Questão 39

As necessidades calóricas durante a gravidez estão aumentadas em cerca de 10% por isso recomendasse um acréscimo de cerca de:

- A) 500 kcal/dia.
- B) 100 kcal/dia.
- C) 300 kcal/dia.
- D) 1000 kcal/dia.

Questão 40

A bacteriúria assintomática em grávidas deve ser pesquisada e tratada. Algumas opções terapêuticas incluem **exceto**:

- A) Nitrofurantoína.
- B) Sulfametoxazol.
- C) Ampicilina.
- D) Ácido Nalidíxico.

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL

Questão 41

Um paciente de 28 anos, masculino, relatando forte dor abdominal progressiva há 2 dias em flanco direito e fossa ilíaca direita e febre baixa, procura a equipe de saúde da família de seu bairro, sem agendar consulta, num fim de tarde, querendo ser atendido.

A política nacional de humanização do Sistema Único de Saúde recomenda, nesse caso, que o paciente deve:

- A) () Ser ouvido, avaliado pela enfermeira e agendado para o dia seguinte.
- B) () Ser ouvido e avaliado por um profissional da equipe e, com base no quadro acima, examinado pelo médico.
- C) () Ser encaminhado para um gastroenterologista para avaliação especializada.
- D) () Ser encaminhado da recepção do serviço ao pronto socorro, pois avaliações de casos urgentes não devem ser feitas na Atenção Primária.

Questão 42

A Sífilis que é de diagnóstico obrigatório na gravidez. Malformações provocadas por esta doença são muito conhecidas. Primigesta de 23 anos, com diagnóstico de sífilis de início recente, durante o pré-natal no consultório do Médico de Família.

A melhor decisão terapêutica nesse caso é:

- A) () Prescrever eritromicina.
- B) () Prescrever tetraciclina.
- C) () Indicar penicilina benzatina.
- D) () Indicar metronidazol.

Questão 43

O Médico de família e Comunidade atende uma criança de sete anos com quadro de diarreia a 10 dias sendo que nos primeiros dias apresentou dor tipo cólicas, e febre de 37.6°C a 38.0°C. A mãe nega presença de sangue, muco ou pus nas fezes com diminuição do volume e frequência. Ao exame, a criança está afebril, ativa, sorridente e apresenta apenas desidratação leve e abdômen normal.

Diante desse quadro, qual seria a conduta mais adequada, além da administração de soro de reidratação oral?

- A) () Prescrever Antibióticos.
- B) () Manter alimentação habitual e observar.
- C) () Prescrever antidiarreico da classe dos obstipantes.
- D) () Prescrever Anti-helmínticos.

Questão 44

Na Estratégia de Saúde da Família são atribuições específicas do Médico, dentre outras, exceto:

- A) () Realizar assistência integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano...
- B) () Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecologia-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos.
- C) () Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de saúde.
- D) () Participar da visita domiciliar planejada.

Questão 45

Uma jovem de 18 anos vem à consulta na Unidade Básica de Saúde da Família por apresentar dor pélvica e na relação sexual há cerca de 2 semanas. Informa que utiliza preservativo apenas ocasionalmente nas relações sexuais e que trocou de parceiro há 1 mês. O exame físico revela, dor à mobilização do colo uterino e à palpação de anexos com secreção vaginal amarelada e fétida. O diagnóstico inicial do médico é DIP.

Dentre os regimes terapêuticos abaixo citados, qual representa a melhor conduta para essa paciente?

- A) () Nistatina creme vaginal 10 dias.
- B) () Ofloxacino + metronidazol por 14 dias e tratar o parceiro.
- C) () Tinidazol via oral em dose única.
- D) () Ampicilina + probenecide via oral por 7 dias.

Questão 46

Mulher de 48 anos com diagnóstico de artrite reumatoide, em uso crônico de corticoide sistêmico. Trouxe resultado do mantoux = 16mm. Nega tosse, febre, sudorese noturna ou emagrecimento. Raio X de tórax é normal e relata que não tem contato com pessoas doentes por tuberculose. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para este caso.

- A) () Observar e marcar retorno mantendo tratamentos anteriores.
- B) () Tratar tuberculose.
- C) () Iniciar quimioprofilaxia para tuberculose.
- D) () Solicitar anti-HIV para estabelecer conduta.

Questão 47

“E assim a cada dia renovamos a esperança de que o SUS que temos seja transformado no SUS que queremos” (Sérgio Arouca).

São princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, exceto:

- A) () Privatização / Terceirização.
- B) () Integralidade / Descentralização.
- C) () Universalização / Hierarquização.
- D) () Universalização / Regionalização.

Questão 48

Dentre as diretrizes e características do modelo assistencial do SUS se destacam:

- 1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- 2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 3- A participação da comunidade.
- 4- A utilização de meios de comunicação para a promoção pessoal de profissionais de saúde como método de avaliação pelos órgãos competentes.

Estão **corretas** as afirmativas:

- A) () 1 e 2 apenas.
- B) () 1, 3, 4 apenas.
- C) () 1, 2 e 3, apenas.
- D) () 1 e 4, apenas.

Questão 49

Considerando a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral e o tratamento, assinale a alternativa incorreta:

- A) () Em pacientes com crise hipertensiva e lipemia, em uso de atorvastatina, a redução da pressão arterial deve ser agressiva e imediata, visando melhorar a perfusão cerebral.
- B) () Após fase aguda, os hipertensos devem ser mantidos com níveis de pressão arterial inferiores a 140/90.
- C) () Tratamento com BRA, IECA, diuréticos, betabloqueadores e outros é benéfico para prevenção primária do AVC.
- D) () Indivíduos recuperados de AVC podem beneficiar-se da associação de anti-hipertensivos assim como a dieta hipossódica.

Questão 50

“A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”. (Portaria GM/MS nº 648) São ações de saúde desenvolvidas na atenção básica, **EXCETO**:

- A) () Ser o primeiro contato com o sistema de saúde.
- B) () Desenvolver ações intersetoriais, integrando projetos sociais voltados para a promoção da saúde.
- C) () Realizar o cuidado em saúde da população da área de abrangência da unidade, efetivando a prática do cuidado familiar.
- D) () Realizar escuta das necessidades dos usuários internados na unidade Hospitalar, promovendo ações curativas e participando da prevenção das infecções Hospitalares.

RASCUNHO DO CARTÃO-RESPOSTA – O preenchimento deste rascunho não é obrigatório.

PROVA	QUESTÕES									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
CLÍNICA MÉDICA										
CIRURGIA GERAL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PEDIATRIA	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Este rascunho não tem valor legal. Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta Personalizado